

記事3



市川市ワクチン接種率 8/1時点

- 1回目 88.8% (65歳以上のみ)
- 2回目 73.4% (65歳以上のみ)



浦安市ワクチン接種率 8/2時点

- 1回目 38.5% (12歳以上) 90.4% (高齢者)
- 2回目 23.9% (12歳以上) 84.1% (高齢者)



千葉県ワクチン接種率

- 1回目 34.1%
- 2回目 25.1%



日本国内ワクチン接種率 8/4時点

- 1回目 45.5%
- 2回目 32.3%

記事4

メーカータイプ	米ファイザー (mRNA ワクチン)	米モデルナ (mRNA ワクチン)	英アストラゼネカ (ウイルスベクター)
接種方法	3週間隔で2回 筋肉注射	4週間隔で2回 筋肉注射	4～12週間隔で2回 筋肉注射
発症予防効果	95%	94%	76%
接種対象者	16歳以上 (米国では12歳以上)	18歳以上	18歳以上
変異株に対する効果	英国型に効果あり 南アフリカ型には効果が やや低下	英国型に効果あり 南アフリカ型には効果が 低下	英国型に効果あり 南アフリカ型には効果なし
主な保管方法	冷凍 -75°C±15°C 6ヶ月保存可能	冷凍 -20°C±15°C 6ヶ月保存可能	冷蔵 2～8°C 6ヶ月保存可能



日本感染症学会 ワクチン委員会

COVLD-19 ワクチンに関する提言作図した資料を参考にしました。